

Tabella delle consociazioni, distanze, concimazioni e irrigazioni

SPECIE	FAMIGLIA DI APPARTENENZA	NON TRAPIANTARE DOPO LA STESSA FAMIGLIA E...	FAVOREVOLE IL TRAPIANTO DOPO	ANNI PRIMA DI RIPETERE SU LO STESSO TERRENO	SPECIE CHE TOLLERA LA MEZZ'OMBRA	CONSOZIAZIONE POSSIBILE	DISTANZA TRA LE PIANTE IN CENTIMETRI		CONCIMAZIONE				IRRIGAZIONE	
							TRA LE FILE	SULLA FILA	ORGANICA QUANTITÀ CONSIGLIATA	IN BUCA CONSIGLIATA AL TRAPIANTO	MESE DOPO IL TRAPIANTO	RIDUZIONE PRIMA DELLA RACCOLTA	SOSPENSIONE PRIMA DELLA RACCOLTA	NOTE: DOPO L'ATTECCIMENTO
AGLIO	LIL	PATATA BIETOLA	COMPOSITE	4	X	LATTUGA - FRAGOLA CAROTA	30	15	MEDIA				X	AL TRAPIANTO E POI SETTIMANALMENTE SOLO IN CASO DI SICCITÀ
ANGURIA	CUC	CUCURBITACEE	LEGUMI COMPOSITE	4	NO	LATTUGA - CIPOLLA SEDANO	200	100	ABBONDANTE	X	X		X	ABBONDARE A INIZIO ALLEGAGIONE E INGROSSAMENTO DEI FRUTTI
ASPARAGO	LIL	PATATA CAROTA ASPARAGO	MAIS FRAGOLA	7	X	LATTUGA SPINACIO FAGIOLINO	100	30	ABBONDANTE	X				SETTIMANALMENTE NEI PERIODI ASCIUTTI
BASILICO	LAB	LABIATE	SOLANACEE	2	X	POMODORO FINOCCHIO CETRIOLO	30	20	MEDIA		X			FREQUENTE SENZA BAGNARE LE FOGLIE
BIETOLA DA COSTE	CHE	SPINACIO BIETOLE	CIPOLLA FAGIOLO	3	X	CIPOLLA RAVANELLO CAVOLI	30	25	MEDIA					FREQUENTE, SENZA RISTAGNI
BIETOLINE DA TAGLIO	CHE	SPINACIO BIETOLE	CIPOLLA FAGIOLO	3	X	CIPOLLA RAVANELLO	30	10	MEDIA		X			FREQUENTE, SENZA RISTAGNI
BIETOLA DA RADICE	CHE	SPINACIO BIETOLE	CIPOLLA FAGIOLO	3	X	CIPOLLA RAVANELLO LATTUGA	30	10	MEDIA			X		FREQUENTE, SENZA RISTAGNI, RIDURRE PRIMA DELLA RACCOLTA
CARCIOFO	COM	CARDO CARCIOFO	SOLANACEE BIETOLA	5	NO	LATTUGA SPINACIO RAVANELLO	100	100	ABBONDANTE	X				SETTIMANALMENTE, IN FASE DI PRODUZIONE, IN CASO DI SICCITÀ.
CARDO	COM	CARDO CARCIOFO	SOLANACEE BIETOLA	4	NO	LATTUGA SPINACIO RAVANELLO	100	100	ABBONDANTE	X	X			FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI NEI PERIODI CALDI E SICCITOSI.
CAROTA	OMB	OMBRELLIFERE BIETOLA	LILIACEE PATATA	3	X	CIPOLLA - PORRO LATTUGA	25	5	MEDIA	X		X		SETTIMANALE IN FASE DI INGROSSAMENTO, SENZA RISTAGNI.
CAVOLI	CRU	SOLANACEE OMBRELLIFERE	LATTUGA CIPOLLA LEGUMI	2	X	FINOCCHIO SEDANO LATTUGA	50	40	ABBONDANTE	X	X	X		IRRIGAZIONI FREQUENTI CON VOLUMI NON ECCESSIVI
CAVOLO RAPA	CRU	SOLANACEE OMBRELLIFERE	LATTUGA CIPOLLA LEGUMI	2	X	BIETOLA - CIPOLLA LATTUGA	40	20	MEDIA	X		X		IRRIGAZIONI FREQUENTI CON VOLUMI NON ECCESSIVI
CECE	LEG	LEGUMINOSE	CUCURBITACEE BIETOLA	2	NO	CAVOLO - CETRIOLO FINOCCHIO	50	10	SCARSA				X	RESISTENTE ALLA SICCITÀ
CETRIOLO	CUC	CUCURBITACEE	LEGUMI	3	ESTATE	LATTUGA - SEDANO CIPOLLA	100	40	ABBONDANTE	X	X			IRRIGAZIONI FREQUENTI CON VOLUMI NON ECCESSIVI
CICORIE DA CESPO	COM	LATTUGA	PORRO PISELLO	3	X	FINOCCHIO LATTUGA POMODORO	40	30	MEDIA			X		ATTENDERE SEMPRE L'ASCIUGATURA DEL TERRENO.
CIPOLLA	LIL	CAVOLO BIETOLA	CETRIOLO POMODORO	3	NO	LATTUGA - CAROTA PISELLO	30	15	MEDIA				X	IN CASO DI SICCITÀ SETTIMANALMENTE IN INGROSSAMENTO.
CIPOLLOTTO	LIL	LILIACEE	PATATA FAGIOLO	3	X	LATTUGA - CAROTA PISELLO	30	5	MEDIA			X		ATTENDERE SEMPRE L'ASCIUGATURA DEL TERRENO.
INDIVIA RICCIA E SCAROLA	COM	LATTUGA CICORIA	RAVANELLO	3	X	RAVANELLO CARCIOFO CIPOLLA	40	30	MEDIA				X	ATTENDERE SEMPRE L'ASCIUGATURA DEL TERRENO.
FAGIOLO E FAGIOLINO	LEG	CUCURBITACEE BIETOLA	BROCCOLI CAVOLI	2	X	ESTATE SEDANO - CAVOLI LATTUGA	50	10	SCARSA			X		IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI.
FAVA	LEG	LEGUMINOSE	BROCCOLI CAVOLI	2	NO	PATATA - LATTUGA CAVOLI	50	10	SCARSA					ESIGENZE IDRICHE LIMITATE. IRRIGARE SOLO CON SICCITÀ
FINOCCHIO	OMB	OMBRELLIFERE CHENOPODIACEE	LEGUMI	3	NO	LATTUGA - CAVOLO SPINACIO	40	25	ABBONDANTE	X	X	X		IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
FRAGOLA	ROS	ROSACEE	CAVOLO OMBRELLIFERE	3	X	LATTUGA - CIPOLLA PREZZEMOLO	100	30	MEDIA	X		X		IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI.
LATTUGA	COM	RADICCHIO LATTUGA	SPINACIO PORRO	2	X	CIPOLLA RAVANELLO POMODORO	40	25	MEDIA					IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
LATTUGHINI DA TAGLIO	COM	COMPOSITE	SOLANACEE BIETOLA	2	X	SEDANO - SPINACIO FINOCCHIO	30	5	MEDIA		X			IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
MAIS DOLCE	GRA	GRAMINACEE	LEGUMI	3	NO	ZUCCA - POMODORO LATTUGA	30	25	ABBONDANTE	X	X			ALLA FORMAZIONE E INGROSSAMENTO DELLA PANNOCCCHIA
MELANZANA	SOL	SOLNACEE CUCURBITACEE	CIC. LATT. CHENOPODIACEE LEGUMI	4	NO	LATTUGA FAGIOLINO CAVOLO	100	40	ABBONDANTE	X	X			TEME CARENZA E RISTAGNI. INNESTATA È MENO DELICATA.
MELONE	CUC	CUCURBITACEE	LEGUMI	4	NO	LATTUGA - CAVOLO FINOCCHIO	150	80	ABBONDANTE	X	X		X	ABBONDARE A INIZIO ALLEGAGIONE E FINE INGROSSAMENTO
OKRA	MAL	MALVACEE	LEGUMI	3	NO	LATTUGA PEPPERONE SEDANO	100	100	MEDIA		X			NEI PERIODI ARIDI, IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI.
PATATA	SOL	SOLANACEE	LEGUMI CAVOLI	4	X	FAVA - SPINACIO FAGIOLO - MAIS	80	30	ABBONDANTE	X	X		X	EVITARE CARENZE PRIMA E DURANTE LA FIORITURA.
PEPPERONE	SOL	SOLANACEE	CIC. LATT. CHENOPODIACEE LEGUMI	4	X	ESTATE LATTUGA - CAVOLO FINOCCHIO	100	40	ABBONDANTE	X	X			TEME CARENZA E RISTAGNI. CONSIGLIATA BAULATURA
PISELLI	LEG	FAGIOLO	CICORIA CAVOLI	2	X	CAVOLO - CETRIOLO FINOCCHIO	50	10	SCARSA					ESIGENZE IDRICHE LIMITATE. IRRIGARE CON SICCITÀ
POMODORO	SOL	CUCURBITACEE ASPARAGO	CIC. LATT. CHENOPODIACEE LEGUMI	3	NO	LATTUGA - SEDANO PISELLO	100	40	ABBONDANTE	X	X	X		ABBONDARE NEI PERIODI SICCITOSI
PORRO	LIL	LILIACEE	CAVOLO CETRIOLO POMODORO	3	X	ESTATE CAVOLO - SEDANO FINOCCHIO	30	15	ABBONDANTE	X	X	X		IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
PREZZEMOLO	OMB	OMBRELLIFERE CHENOPODIACEE	LATTUGA	3	X	RAVANELLO SPINACIO - FRAGOLA	15	5	SCARSA					IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI.
RAVANELLO	CRU	CRUCIFERE	INSALATE POMODORI PORRI	2	X	PREZZEMOLO - SPINACIO LATTUGA	15	5	SCARSA			X		IRRIGAZIONI SCARSE MA FREQUENTI.
RUCOLA	CRU	CRUCIFERE		2	X	PORRO - SPINACIO LATTUGA	15	5	MEDIA			X		IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI. IRRIGANDO SALTUARIAMENTE SI OTTIENE UN SAPORE PIÙ INTENSO.
SCALOGNO	LIL	CAVOLO BIETOLA	CETRIOLO POMODORO	3	X	LATTUGA - CAROTA PISELLO	30	15	MEDIA				X	SETTIMANALMENTE SOLO IN CASO DI SICCITÀ
SEDANO	OMB	OMBRELLIFERE CHENOPODIACEE	LEGUMI	3	X	MELANZANA POMODORO PORRO	40	25	ABBONDANTE	X	X	X		IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
SPINACIO	CHE	BIETOLA SPINACIO	CAVOLO INSALATE ZUCCHINE	2	X	FAGIOLO - CIPOLLA CARCIOFO	25	5	MEDIA					IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
VALERIANA	VAL	VALERINACEE		2	X	LATTUGA - CICORIA PORRO	25	5	MEDIA					IRRIGAZIONI FREQUENTI EVITANDO I RISTAGNI.
ZUCCA	CUC	ZUCCHINO POMODORO	LEGUMI LATTUGA	3	NO	SEDANO FINOCCHIO CAVOLO	200	100	MEDIA	X	X		X	ABBONDARE A INIZIO ALLEGAGIONE E INGROSSAMENTO DEI FRUTTI.
ZUCCHINO	CUC	CUCURBIT. POMODORO	LEGUMI LATTUGA CAVOLI	3	NO	LATTUGA RAVANELLO SPINACIO	120	80	ABBONDANTE	X	X			ABBONDARE A GIORNI ALTERNI NEI PERIODI MOLTO CALDI.

CONCIMAZIONE ORGANICA DI FONDO: Letame, stallatico, pollina, cornungia ecc. si apporta principalmente nel periodo invernale, interrata con la vangatura. Se non è stata apportata prima, fornirla prima del trapianto.

CONCIMAZIONE IN BUCA: Guano, pollina, compost, fertilizzanti NPK ecc. possono essere collocati in buca al trapianto, non a contatto con le radici o ancora meglio 2 settimane prima.

CONCIMAZIONE DOPO IL TRAPIANTO: per le specie a ciclo lungo che amano concimazioni abbondanti per produzioni più generose è consigliabile apportare concime NPK o a base di borlanda ogni 3 settimane anche durante la coltivazione.



Gli Specialisti dell'Orto

Azienda Agricola Orto Mio | Via Zampeschi 156, 47122 - Forlì

Tel. +39 0543 799097 | FAX +39 0543 799193 | e-mail: info@ortomio.it | www.ortomio.it